



PROTEGE A TU EQUIPO Y SALVA A TUS PACIENTES

PROTOSCOLOS DE RCP EN TIEMPOS DE COVID-19

ESCENARIO N°1 SOPORTE VITAL BÁSICO CON B-CARD

OBJETIVOS



Mejorar la **protección del personal sanitario** con un dispositivo de uso **único**



Parada cardiorrespiratoria **presenciada o hasta de 5 min** de evolución.

Inicio de la **cardiocompresión** en los primeros **5 min** después de la parada.



RCP de calidad en el caso de **no disponer de un ventilador**: permite ejecutar **compresiones torácicas ininterrumpidas con oxigenación y ventilación con presión positiva**



CRITERIOS DE INCLUSIÓN



Sin otros criterios de **NO reanimación** o de limitación de esfuerzo terapéutico y según las circunstancias de su hospital receptor.

PROCEDIMIENTO EN SOPORTE VITAL BÁSICO



1

Orden de continuar masaje.




2

EPI adecuado.



3

Desfibrilación si corresponde.



4

Inicio de **cardiocompresión continua, cánula orofaríngea.**



5

Colocación **mascarilla + filtro + B-Card.**



6

Si ROSC aplicar ambú sobre filtro-mascarilla y traslado hospitalario o espera a SVA



Protocolo diseñado por el Dr. Ignacio Garrote, del Servicio de Emergencias Sanitarias SESCOAM en colaboración con el Dr. Georges Boussignac.