



A toda paciente que acuda con síntomas de infección respiratoria aguda se le colocará una **mascarilla quirúrgica**



Las pacientes que se identifiquen como casos posibles deberán separarse en una **zona de aislamiento**. El personal que les acompañe hasta la zona de aislamiento llevará mascarilla



Se **comprobará la viabilidad y el bienestar fetal**, mediante ecografía y/o RCTG en función de las semanas de embarazo




El **control del bienestar fetal** se realizará en función de los criterios obstétricos y en función de las semanas de embarazo



La habitación de aislamiento deberá contar idealmente con cama, cuna térmica, monitorización fetal, oxigenoterapia, carro de medicación, en previsión de la realización del parto en este habitáculo.



Reducir el número de profesionales que accedan a la habitación de la mujer infectada y quienes lo hagan deberán adoptar las medidas de protección adecuadas a la exposición de riesgo



Determinar si un paciente con infección respiratoria aguda (**IRA**) cumple los criterios de caso en posible de SARS-CoV-2



Los **casos posibles deben permanecer aislados**, bajo precauciones de aislamiento por contacto y por gotas. Si el cuadro clínico no lo precisa y se puede garantizar el aislamiento domiciliario



Dada la posibilidad de necesitar practicar medidas de reanimación neonatal y la existencia de gestantes asintomáticas, sería muy recomendable conocer el estado de la mujer frente al COVID-19 antes del parto



Los **equipos y material deberán ser desechables** o de uso exclusivo de la gestante. Si no puede ser así, se desinfectará después de cada uso, tal y como especifique el fabricante



Se **limitará al máximo el transporte** y se restringirá el movimiento de la gestante fuera de la habitación



Tras el ingreso se podrá plantear el manejo de la mujer embarazada en el domicilio si la situación clínica es buena, y los condicionantes sociales y la vivienda así lo permiten

- Avisar al centro que controle el embarazo del aislamiento
- Avisar al centro antes de acudir a las citas programadas.
- Recomendar no acudir a urgencias si no es estrictamente necesario.

Actuación ante la llegada de una embarazada a urgencias con sospecha de COVID-19

Manejo de la mujer embarazada y el recién nacido con COVID-19

Recomendaciones del Ministerio de Sanidad