

Manejo perinatal del recién nacido con infección posible o probable por COVID-19

Manejo de la mujer embarazada y el recién nacido con COVID-19

Recomendaciones del Ministerio de Sanidad

RECIÉN NACIDO ASINTOMÁTICO

A MADRES PAUCISINTOMÁTICAS O ASINTOMÁTICAS CON INFECCIÓN CONFIRMADA O PROBABLE



Evitar la separación de la madre de su recién nacido y favorecer el alojamiento conjunto.



Prevenir infecciones por contacto y por gotas: lavado e **higiene de manos** antes de coger al bebé, **mascarilla y cuna separada a 2m** de la cama de la madre



Se animará y ayudará a las madres a **amamantar** a demanda. Cubir la ropa de la madre con una bata



Tanto los niños en situación de alojamiento conjunto como de aislamiento, se hará **seguimiento clínico y monitorización básica**

B MADRES SINTOMÁTICA CON INFECCIÓN PROBABLE O CONFIRMADA



Sólo tendrá que ser **ingresado aislado** y separado de su madre **cuando las condiciones clínicas** de esta así lo recomiendan




Facilitar el **contacto piel con piel, cuidado madre canguro...**, especialmente en los momentos inmediatamente posteriores al nacimiento y durante el establecimiento de la lactancia



Si durante este periodo de separación la madre desea **amamantar** y su situación clínica lo permite, se le ofrecerá la ayuda necesaria para extraerse leche y que pueda ser administrada a su bebé y **permítala lactancia**


RECIÉN NACIDO SINTOMÁTICO



1 Ingreso en **habitación individual** con **medidas de aislamiento** de contacto y por gotas (útil uso de incubadora)



2 **Monotorización** de las constantes y **vigilancia clínica**



3 Se tomarán muestras para el **seguimiento microbiológico** y los controles analíticos que se consideren Se valorará la realización de estudios de imagen radiografía y/o ecografía de tórax.



4 El **manejo clínico no difiere** del de cualquier **neonato con la misma sintomatología**. En casos de **distrés respiratorio** agudo grave, se valorará el **uso de surfactante** a dosis habituales, ventilación de alta frecuencia y/o óxido nítrico inhalado.



5 Se **limitarán las visitas** a excepción del cuidador principal sano, que utilizará EPI para el acceso a la habitación



6 Si se descarta la infección por SARS-CoV-2, se **puede retirar el aislamiento** y el alta domiciliaria se adaptará a los criterios clínicos habituales