

VÍAS DE ACCESO PARA LA NUTRICIÓN ENTERAL EN NEONATOS: SONDAS ORO/NASOENTERALES

SONDA GÁSTRICA

SONDA OROGÁSTRICA

- ▶ Cuando el paciente **presenta asistencia respiratoria** no invasiva
- ▶ **Pacientes prematuros** en los que el **tamaño de la nariz** es reducido y podría provocar pequeñas heridas
- ▶ Para **no aumentar la resistencia** en la **vía aérea superior**

SONDA NASOGÁSTRICA

- ▶ Cuando el neonato **comienza con alimentación oral** para favorecer un correcto **sellado al pecho** y **facilitar el desarrollo del reflejo de succión-deglución**.
- ▶ Para **reducir la extracción accidental** de la sonda

SONDA TRANSPILÓRICAS

Sólo se planteará la colocación **cuando la tolerancia gástrica sea disminuida**. Las sondas **postpilóricas**, en neonatos, solo podrán ser **nasoduodenales**

CONTRAINDICACIONES

- ▶ **Recién nacido que no requiera evacuación gástrica**, y que pueda alimentarse por succión.
- ▶ Presencia de una **atresia y estenosis esofágica** o **fístula traqueo-esofágica**
- ▶ Periodo **postoperatorio inmediato** en el caso de **cirugías** en boca, faringe, esófago o estómago
- ▶ Alteraciones estructurales como en el caso de la **atresia de coanas**
- ▶ En caso de **fractura de base de cráneo**, **rotura de huesos de la cara** y **taponamiento nasal** se utilizará la vía orogástrica

