

ESCALA DE BELL MODIFICADA

ESTADIO	CLASIFICACIÓN	SIGNOS			
		CLÍNICOS	ABDOMINALES	RADIOGRÁFICOS	
I	A	SOSPECHA	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Inestabilidad térmica ▸ Apnea ▸ Bradicardia ▸ Letargo 	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Distensión abdominal ▸ Retención gástrica ▸ Vómitos ▸ Sangre oculta en heces 	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Estado normal o leve dilatación de las asas intestinales ▸ Íleo leve
	B	SOSPECHA	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Mismos signos que IA ▲ 	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Hematoquecia 	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Mismos signos que IA ▲
II	A	CONFIRMADA (LEVE)	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Mismos signos que I ▲ 	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Mismos signos que I ▲ ▸ Ausencia de ruidos intestinales ▸ Con/sin dolor en la palpación 	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Dilatación de las asas ▸ Íleo ▸ Neumatosis intestinal
	B	CONFIRMADA (MODERADA)	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Mismos signos que IIA ▲ ▸ Acidosis metabólica ▸ Trombocitopenia 	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Mismos signos que IIA ▲ ▸ Acidosis metabólica ▸ Trombocitopenia 	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Mismos signos que IIA ▲ ▸ Ascitis temprana
III	A	AVANZADA (SEVERA), CON PRESERVACIÓN DE INTESTINO	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Mismos signos que IIB ▲ ▸ Hipotensión ▸ Bradicardia ▸ Apena grave ▸ CID ▸ Acidosis mixta ▸ Neutropenia 	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Mismos signos que IIB ▲ ▸ Signos de peritonitis ▸ Distensión abdominal ▸ Dolor a la palpación marcada 	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Mismos signos que IIB ▲ ▸ Ascitis prominente
	B	AVANZADA (SEVERA) CON INTESTINO PERFORADO	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Mismos signos que IIIA ▲ 	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Mismos signos que IIIA ▲ 	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Mismos signos que IIIA ▲ ▸ Neumoperitoneo