

RIESGOS DE UNA GESTIÓN INADECUADA DE LA PRESIÓN ARTERIAL

1 Extremos de presión arterial perjudiciales

PAM demasiado baja o alta se asocia con una alta tasa de disfunción orgánica, especialmente lesión renal aguda (AKI).

- Una curva en forma de "U", se asocia con una menor tasa de disfunción orgánica.
- Intentar alcanzar una PAM más alta no mejora los resultados y puede causar más efectos secundarios.

3 Inotrópicos y complicaciones


Intentar maximizar el gasto cardíaco tras anestesia general, especialmente mediante el uso de inotrópicos como la dobutamina, puede aumentar la tasa de complicaciones.



2 Aumento del riesgo de AKI

La reducción del uso de fluidos y el incremento de vasopresores se asocia con una mayor incidencia de lesión renal aguda.

- Administrar vasopresores de forma sistemática para restaurar PAM (sin identificar causa) no mejora los resultados.
- Una buena PAM no siempre garantiza una perfusión adecuada.



4 Sistemas de alerta temprana

Aunque los sistemas de alerta temprana para la hipotensión pueden reducir el número de episodios de hipotensión, no se ha demostrado que disminuyan la tasa de lesión renal aguda ni que mejoren los resultados generales.