

NECESSIDADES DE ACESSO VASCULAR PARA DOENTES ADULTOS: UTILIZAÇÃO EXTRA-HOSPITALAR

< 4–6 MESES

ACESSO PERIFÉRICO É ADEQUADO

<3-4 semanas
Mini-Midline
>3-4 semanas
Midline

É NECESSÁRIO ACESSO CENTRAL

Veias do braço disponíveis:
PICC sem manga de dacron, tunelizado ou não

Veias do braço indisponíveis:
CVC tunelizado sem manga de dacron

Obstrução da veia cava superior:
FICC tunelizado sem manga de dacron

> 4–6 MESES

UTILIZAÇÃO FREQUENTE

Veias do braço disponíveis:
PICC tunelizado com manga de dacron e um SDD

Veias do braço indisponíveis:
CVC tunelizado com manga de dacron e um SDD

Obstrução da veia cava superior:
FICC tunelizado com manga de dacron e um SDD

UTILIZAÇÃO EPISÓDICA

Veias do braço disponíveis:
PICC-port

Veias do braço indisponíveis:
Chest port

Obstrução da veia cava superior:
Port femoral ou FICC tunelizado com manga de dacron e um SDD

PICC: Cateter venoso central de inserção periférica

CVC: Cateter venoso central

FICC: Cateter venoso central de inserção femoral

SDD: Dispositivo subcutâneo de estabilização